



カブラヤガ

ヤガ科 前翅長 16.5 ～ 18mm
食草：アブラナ科などの草本類
幼虫はネキリムシと呼ばれる畑の害虫。
日中は土に隠れ、夜間に野菜苗の根際を
切断し枯らしてしまう。



ナカグロクチバ

ヤガ科 前翅長 20 ～ 22mm
食草：イヌタデ・エノキグサなど
成虫の翅の先がめくれているように見える。
温暖化で見られるようになった。




タイワンキシタアツバ

ヤガ科 前翅長 15 ～ 16mm
食草：ヤブマオ・カラムシ(イラクサ科)
類似種に、キシタアツバ・クロキシタア
ツバがいる。



アカエグリバ

ヤガ科 前翅長 20 ～ 25mm
食草：アオツツラフジ
成虫の翅は枯葉に擬態している。成虫は
果実を吸汁。



キシタバ

ヤガ科 前翅長 33mm くらい
食草：フジ・コナラなど
成虫の後翅に黄色と黒色の模様あり。



アケビコノハ

ヤガ科 前翅長 50 ～ 55mm 食草：アケビ・ヒイラギナンテン 幼虫は眼状紋を強調する
ように体を折り曲げる。成虫の前翅は枯葉に擬態、後翅は黄色に黒色の渦巻き紋。